

Qualità dell'aria C.O.V. nel distretto Conciario

Assemblea Agenzia Giada

Gambellara


21 settembre 2009

giada



Monitoraggio della qualità dell'aria 1996/2008


Composti Organici Volatili ($\mu\text{gCOV}/\text{mc}$) – Punti A



Il dato 1996 è un valore derivante dall'utilizzo di un modello di dispersione degli inquinanti (ISC3 – E.P.A.)

Monitoraggio della qualità dell'aria 1996/2008


Composti Organici Volatili ($\mu\text{gCOV}/\text{mc}$) – Punti A



Il dato 1996 è un valore derivante dall'utilizzo di un modello di dispersione degli inquinanti (ISC3 – E.P.A.)

Monitoraggio della qualità dell'aria 1996/2008


Composti Organici Volatili ($\mu\text{gCOV}/\text{mc}$) – Punti A



Il dato 1996 è un valore derivante dall'utilizzo di un modello di dispersione degli inquinanti (ISC3 – E.P.A.)

Monitoraggio della qualità dell'aria 1996/2008


Composti Organici Volatili ($\mu\text{gCOV}/\text{mc}$) – Punti A



Il dato 1996 è un valore derivante dall'utilizzo di un modello di dispersione degli inquinanti (ISC3 – E.P.A.)

Monitoraggio della qualità dell'aria 1996/2008


Composti Organici Volatili ($\mu\text{gCOV}/\text{mc}$) – Punti A



Il dato 1996 è un valore derivante dall'utilizzo di un modello di dispersione degli inquinanti (ISC3 – E.P.A.)

Monitoraggio della qualità dell'aria 1996/2008


Composti Organici Volatili ($\mu\text{gCOV}/\text{mc}$) – Punti A



Il dato 1996 è un valore derivante dall'utilizzo di un modello di dispersione degli inquinanti (ISC3 – E.P.A.)

Monitoraggio della qualità dell'aria 1996/2008


Composti Organici Volatili ($\mu\text{gCOV}/\text{mc}$) – Punti A



Il dato 1996 è un valore derivante dall'utilizzo di un modello di dispersione degli inquinanti (ISC3 – E.P.A.)

Monitoraggio della qualità dell'aria 1996/2008


Composti Organici Volatili ($\mu\text{gCOV}/\text{mc}$) – Punti Ab



Il dato 1996 è un valore derivante dall'utilizzo di un modello di dispersione degli inquinanti (ISC3 – E.P.A.)

Monitoraggio della qualità dell'aria 1996/2008


Composti Organici Volatili ($\mu\text{gCOV}/\text{mc}$) – Punti Ab



Il dato 1996 è un valore derivante dall'utilizzo di un modello di dispersione degli inquinanti (ISC3 – E.P.A.)

Monitoraggio della qualità dell'aria 1996/2008

Composti Organici Volatili ($\mu\text{gCOV}/\text{mc}$) – Punti B




Il dato 1996 è un valore derivante dall'utilizzo di un modello di dispersione degli inquinanti (ISC3 – E.P.A.)

Monitoraggio della qualità dell'aria

1996/2008


Composti Organici Volatili ($\mu\text{gCOV}/\text{mc}$) – Punti C



Il dato 1996 è un valore derivante dall'utilizzo di un modello di dispersione degli inquinanti (ISC3 – E.P.A.)

Monitoraggio della qualità dell'aria 1996/2008


Composti Organici Volatili ($\mu\text{gCOV}/\text{mc}$) – Punti C



Il dato 1996 è un valore derivante dall'utilizzo di un modello di dispersione degli inquinanti (ISC3 – E.P.A.)

Monitoraggio della qualità dell'aria 1996/2008


Composti Organici Volatili ($\mu\text{gCOV}/\text{mc}$) – Punti C



Il dato 1996 è un valore derivante dall'utilizzo di un modello di dispersione degli inquinanti (ISC3 – E.P.A.)

Monitoraggio della qualità dell'aria 1996/2008


Composti Organici Volatili ($\mu\text{gCOV}/\text{mc}$) – Punti C



Il dato 1996 è un valore derivante dall'utilizzo di un modello di dispersione degli inquinanti (ISC3 – E.P.A.)

Monitoraggio della qualità dell'aria 1996/2008


Composti Organici Volatili ($\mu\text{gCOV}/\text{mc}$) – Punti C



Il dato 1996 è un valore derivante dall'utilizzo di un modello di dispersione degli inquinanti (ISC3 – E.P.A.)

Monitoraggio della qualità dell'aria 1996/2008


Composti Organici Volatili ($\mu\text{gCOV}/\text{mc}$) – Tutti i punti A



Il dato 1996 è un valore derivante dall'utilizzo di un modello di dispersione degli inquinanti (ISC3 – E.P.A.)

Monitoraggio della qualità dell'aria 1996/2008


Composti Organici Volatili ($\mu\text{gCOV}/\text{mc}$) – Tutti i punti B



Il dato 1996 è un valore derivante dall'utilizzo di un modello di dispersione degli inquinanti (ISC3 – E.P.A.)

Monitoraggio della qualità dell'aria 1996/2008


Composti Organici Volatili ($\mu\text{gCOV}/\text{mc}$) – Tutti i punti Ab



Il dato 1996 è un valore derivante dall'utilizzo di un modello di dispersione degli inquinanti (ISC3 – E.P.A.)

Monitoraggio della qualità dell'aria 1996/2008


Composti Organici Volatili ($\mu\text{gCOV}/\text{mc}$) – Tutti i punti C



Il dato 1996 è un valore derivante dall'utilizzo di un modello di dispersione degli inquinanti (ISC3 – E.P.A.)

Monitoraggio della qualità dell'aria 1996/2008

Composti Organici Volatili ($\mu\text{gCOV}/\text{mc}$) – Punti critici (1)




Il dato 1996 è un valore derivante dall'utilizzo di un modello di dispersione degli inquinanti (ISC3 – E.P.A.)

Monitoraggio della qualità dell'aria 1996/2008

Composti Organici Volatili ($\mu\text{gCOV}/\text{mc}$) – Punti critici (2)

Arzignano n.20




Il dato 1996 è un valore derivante dall'utilizzo di un modello di dispersione degli inquinanti (ISC3 – E.P.A.)

Monitoraggio della qualità dell'aria 1996/2008

Composti Organici Volatili ($\mu\text{gCOV}/\text{mc}$) – Punti critici (3)

Montorso n.22




Il dato 1996 è un valore derivante dall'utilizzo di un modello di dispersione degli inquinanti (ISC3 – E.P.A.)

Monitoraggio della qualità dell'aria 1996/2008

Composti Organici Volatili ($\mu\text{gCOV}/\text{mc}$) – Punti critici (4)

Zermeghedo n.26




Il dato 1996 è un valore derivante dall'utilizzo di un modello di dispersione degli inquinanti (ISC3 – E.P.A.)

Monitoraggio della qualità dell'aria 1996/2008

Composti Organici Volatili ($\mu\text{gCOV}/\text{mc}$) – Punti critici (5)

Montebello n.30




Il dato 1996 è un valore derivante dall'utilizzo di un modello di dispersione degli inquinanti (ISC3 – E.P.A.)


Rapporto produzione/consumo solventi (1996/2008)

Consumo solventi		Fattore di emissione		Produzione pelli	
anno	consumo in Kg	anno	espresso in g/mq	anno	pelle prodotta in mq
1996	18.449.000	1996	146	1996	125.976.000
1997	17.128.000	1997	133	1997	128.350.000
1998	15.295.000	1998	115	1998	132.856.000
1999	13.489.000	1999	94	1999	143.422.000
2000	12.852.000	2000	78	2000	165.221.000
2001	12.756.000	2001	79	2001	160.766.000
2002	11.467.000	2002	67	2002	170.983.000
2003	9.751.000	2003	58	2003	167.631.000
2004	8.795.000	2004	50	2004	174.577.000
2005	7.947.000	2005	49	2005	162.038.000
2006	7.344.000	2006	44	2006	165.514.000
2007	6.648.000	2007	44	2007	150.858.000
2008	6.132.000	2008	45	2008	133.622.000

Rapporto produzione/consumo solventi 1996/2008




Riduzione delle emissioni di C.O.V. concentrazioni radiello e consumo solventi (Punti C) 1996/2008




Il dato 1996 sui radiello deriva dall'utilizzo di un modello di dispersione degli inquinanti (ISC3 – E.P.A.)

Aziende con fattore di emissione < 75gSOV/metro quadro (%) 1996/2008




giada

Consumo di solventi per territorio comunale 1996/2008




giada

Consumo di solventi per territorio comunale 1996/2008




giada

Consumo di solventi per territorio comunale 1996/2008




giada

Consumo di solventi per territorio comunale 1996/2008




giada

Consumo di solventi per territorio comunale 1996/2008




giada

Consumo di solventi per territorio comunale 1996/2008




giada

Ripartizione produzione per Comune (% periodo 1996/2008)



Ripartizione produzione per Comune (% anno 2008)



Arzignano Chiampo Lonigo Montebello Montorso Zermeghedo Altri

Confronto tra i fattori di emissione dei singoli articoli (1999/2006) (grammi solvente/metro quadro di pelle)

Fattore di emissione per tipologia (confronto dati 1999/2006)

